

2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷

社区护理学参考答案

金英杰国家医学考试研究中心 编



 北京金英杰图书有限公司

模拟试卷(一)

基础知识

1.答案:B

2.答案:B

3.答案:C

4.答案:E

5.答案:B

6.答案:C

7.答案:E

8.答案:D

9.答案:C

10.答案:A

11.答案:C

12.答案:A

13.答案:E

14.答案:E

15.答案:B

16.答案:C

17.答案:B

18.答案:B

19.答案:C

20.答案:E

21.答案:E

解析:破伤风属于特异性感染。

22.答案:D

解析:在新生儿卵巢内约有 200 万个卵泡,但在女性一生中仅有 400~500 个卵泡发育成熟。

23.答案:C

解析:复苏后最容易出现脑水肿。

24.答案:B

解析:胸腔穿刺有气体说明有气胸,有血液说明有损伤引起的出血。

25.答案:B

26.答案:B

27.答案:B

解析:梗阻以后消化道分泌液体不能被吸收,积存在肠道。

28.答案:B

解析:凡是肝功能受损的疾病,其他 4 项检验项目均可升高,只有甲胎蛋白对肝癌具有较强的特异性。

29.答案:C

解析:部分卵巢恶性肿瘤如上皮性卵巢癌、无性细胞瘤、含睾丸细胞瘤中的 1/4 病人有家族史;约 20% 的卵巢癌病人有家族史,其中主要是上皮性卵巢癌。

30.答案:D

解析:浆液性囊腺瘤约占卵巢良性肿瘤的 25%。

31.答案:D

32.答案:B

解析:动脉狭窄属心脏后负荷增高,当心脏后负荷增高时,常以心肌肥厚作为主要的代偿机制。

33.答案:D

解析:高血压可引起心脏后负荷增加,即外周血管阻力增加。

34.答案:C

解析:急性胃炎是急性胃黏膜的炎症,包括急性单纯性胃炎、糜烂性胃炎、腐蚀性胃炎,以急性单纯型胃炎最为多见。

35.答案:D

解析:病毒、细菌和支原体感染是慢性支气管炎发生及加重的重要因素之一。

36.答案:C

37. 答案: B

解析: 上呼吸道感染的病原体 90% 以上是病毒。

38. 答案: E

解析: 慢性胃体胃炎病人血清促胃液素水平常明显升高, 可有抗壁细胞抗体和抗内因子抗体。

39. 答案: D

解析: 劳累、情绪激动、饱食、受寒、急性循环衰竭是心绞痛发生的诱因。

40. 答案: B

解析: 子痫前期轻度诊断标准: 血压 $> 140/90$ mmHg (18.7/12 kPa), 尿蛋白 > 0.3 g/24 h 或随机尿蛋白(+); 伴上腹不适、轻度水肿、头痛、视力模糊等。

41. 答案: D

解析: 主要考查先天性巨结肠的发病机制, 备选答案是对发病机制的描述, 根据我们已掌握的知识, 先天性巨结肠可能是在胚胎发育过程中, 受到病毒、感染、药物、遗传等因素的作用, 使形成肠壁神经丛的神经节细胞发育停滞, 致局部肠壁间神经丛和黏膜下神经丛缺乏神经节细胞。

42. 答案: D

43. 答案: A

44. 答案: B

解析: 黄体功能不足为排卵性功血, 月经周期中有卵泡发育及排卵, 但黄体期孕激素分泌不足或黄体过早衰退。因此, 表现为基础体温呈双相型, 但上升缓慢, 高温相短。

45. 答案: B

46. 答案: A

47. 答案: A

48. 答案: A

49. 答案: C

50. 答案: E

51. 答案: C

52. 答案: D

53. 答案: D

54. 答案: E

55. 答案: C

56. 答案: C

57. 答案: B

58. 答案: A

59. 答案: E

60. 答案: C

61. 答案: B

62. 答案: D

63. 答案: D

64. 答案: B

65. 答案: A

66. 答案: C

67. 答案: A

68. 答案: C

69. 答案: C

70. 答案: B

71. 答案: C

72. 答案: B

73. 答案: E

74. 答案: C

75. 答案: D

76. 答案: B

77. 答案: E

78. 答案: C

79. 答案: C

80. 答案: A

81. 答案: B

82. 答案: A

解析: 腹膜刺激征(压痛、肌紧张、反跳痛)是腹膜炎的标志性体征。

83. 答案: C

84. 答案: C

85. 答案: B

86. 答案: E

87. 答案: B

88. 答案: A

89. 答案: C

90. 答案: D

解析:游离移植:移植物从供体取下时,完全断绝与供体的各种联系,移植至受体后重新建立血液循环,如游离皮片移植。带蒂移植:是自体移植的一种方法,移植物从供体取下后,并没有完全脱离,尚有一部分相连,主要包括血管和神经,使移植物的存活率提高。等移植物在受体上完全建立血液循环时,再将蒂切断。如带蒂皮瓣、带蒂肌瓣、带蒂大网膜移植等。吻合移植:利用血管吻合技术,将移植物中的血管与受体的血管吻合,使移植器官即刻得到血液供应,如断肢再植、肾移植和肝移植等。输注移植:将具有活力的细胞输注到受体的血管、体腔或组织器官内的方法,如输血、骨髓移植、干细胞移植、胰岛移植等。

91.答案:C

92.答案:D

93.答案:B

94.答案:A

95.答案:E

96.答案:E

97.答案:C

98.答案:B

99.答案:D

100.答案:C

解析:子宫借助于4对韧带以及骨盆底肌肉和筋膜的支托作用来维持正常的位置。圆韧带具有维持子宫前倾位的作用;阔韧带使子宫在腔的正中位置;主韧带又称宫颈横韧带,是固定宫颈正常位置的重要组织;宫骶韧带间接保持子宫于前倾位置。

相关专业知识

1.答案:C

2.答案:E

解析:在医院中严重的是移位菌群失调,即正常菌群由原籍生境转移到外籍生境或本来无菌的部位定植或定居,如大肠中的大肠埃希菌、铜绿假单胞菌转移到呼吸道或泌尿道定居。其原因多为不适当地使用抗生素,即该部位的正常菌群被抗生素抑制或消灭,从而为外来菌或过路菌提供了生存的空间和定植的条件。

3.答案:D

4.答案:C

解析:快速压力蒸汽灭菌物品在干燥的情况下可保存7~14天。如果潮湿则认为被污染,应重新灭菌。

5.答案:E

6.答案:C

解析:设置隔离室最主要的目的是切断感染链中的传播途径,保护易感者。将感染源与传播的途径分开是防止感染性疾病传

播的重要措施。

7.答案:A

8.答案:A

解析:高度危险性物品是穿过皮肤或黏膜而进入无菌的组织或器官内部的器材,或与破损的组织、皮肤黏膜密切接触的器材和用品,如手术器械和用品、穿刺针、输血器材、输液器材、注射的药物和液体、透析器、血液和血液制品、导尿管、膀胱镜、腹腔镜、脏器移植物和活体组织检查钳等。

9.答案:A

10.答案:A

解析:管理与政策诊断的核心内容是组织评估和资源评估。

11.答案:C

12.答案:A

解析:对不耐热、不耐湿物品进行消毒时可选用环氧乙烷气体灭菌。

13.答案:E

14.答案:E

解析:终末质量评价是评价护理活动的最终效果,指每个病人最后的护理结果或成批病人的护理结果质量评价。

15.答案:C

16.答案:A

解析:为防止使用后的污染利器(针、刀、其他利器)刺伤,小心处理用过的尖锐物品(针及手术刀等),如使用后针头不覆帽且不复用,不用手去除针头,若要人为去除针头时,应使用其他技术和可用器械设备除去针头。用后的针头及尖锐物品应弃于耐刺硬壳防水容器内。

17.答案:C

18.答案:C

解析:连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、早产儿暖箱应每日消毒,用后终末消毒,干燥保存。湿化液应用灭菌水。

19.答案:E

20.答案:C

解析:各种微生物(细菌)经常从不同环境落到人体,并能在一定部位定居和不断生长、繁殖后代,送种现象通常称为“细菌定植”。

21.答案:E

22.答案:A

解析:科学管理理论的基本出发点是提高劳动生产效率,其主要内容是:①使工作方法、劳动工具、工作环境标准化;②确定合理的工作量;③挑选和培训工人,使其掌握标准工作方法;④实行差别工资制;⑤实行职能工长制。

23.答案:C

24.答案:A

解析:用过的医疗器材和物品,应先除污物、清洗,再消毒或灭菌;其中感染病人用过的医疗器械和物品,应先消毒、清洗,再消毒或灭菌。

25.答案:A

26.答案:D

解析:危害健康行为的类型:①日常危害健康行为;②致病性行为模式;③不良疾病行为;④违规行为。

27.答案:D

28.答案:C

解析:高水平消毒剂是过氧化氢;中水平消毒剂是聚维酮碘、乙醇;低水平消毒剂是苯扎溴铵、氯己定。

29.答案:D

30.答案:D

解析:近年来,真菌引起的院内感染呈现进一步增长的趋势,常见的真菌感染是白色念珠菌、热带念珠菌和曲霉菌。念珠菌感染多发生在长期应用广谱抗生素或免疫力低下病人身上,常导致深部感染。

31.答案:A

32.答案:C

解析:环节质量评价常用的评价指标:①护理技术操作合格率;②基础护理合格率;③特护、一级护理合格率;④各种护理表格书写合格率;⑤一人一针一管执行率;⑥常规器械消毒灭菌合格率。

33.答案:D

34.答案:D

解析:经粪-口途径传播的肝炎病毒为甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒。乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒均主要经血液传播(输血、使用血制品、静脉吸毒、通过诊疗器械等),亦可经日常生活中的密切接触传播。

35.答案:D

36.答案:A

解析:术前预防性应用抗生素的指征:①污染手术,如复杂外伤、战伤、开放性骨关节伤、严重烧伤、伴溃疡坏疽的截肢术、感染性病灶(如脑脓肿)等手术和各种咬伤等;连通口咽部的颈部手术;回肠远端及结肠手术;腹部空腔脏器破裂或穿通伤;高危胆道手术;经阴道子宫切除术。②发生感染将引

起严重后果者,如心脏瓣膜病或已置入人造心脏瓣膜者因病需行其他手术者、脑脊液鼻漏者以及器官移植术等。③各种人造物修补、置换或留置手术,如人工心脏瓣膜置换手术、人造关节置换术、人造血管移植术、脑室心房分流管放置术等。④手术范围大、时间长的清洁手术。

37.答案:D

解析:一级医院的医护比为1:1,二级和三级医院的医护比为1:2。

38.答案:B

解析:科学管理理论的创始人是泰勒,他首次提出了科学管理的概念,1911年出版《科学管理原理》一书,被公认为“科学管理之父”。

39.答案:B

解析:医用物品对人体的危险性是指物品污染后造成危害的程度,根据其危害程度将其分为3类。

40.答案:B

解析:主动发展阶段在3~12岁,此阶段的行为有明显的主动性,其主要表现为爱探究、易激惹、喜欢自我表现等。

41.答案:E

42.答案:D

解析:随着计算机技术的日益成熟和广为应用,有关组织结构管理幅度与管理层级的理论也发生着革命性的变化,最突出的体现就是组织中的中层功能正逐渐由计算机来处理完成,使得管理幅度变宽和管理层级变少,组织也日益由高耸型走向扁平化。组织扁平化是未来管理向领导者、从事人力资源管理工作者提出的挑战。

43.答案:C

解析:从组织图可以了解纵向的各部门或各职位之间的指导、指挥、管辖等关系;也可以了解横向的各部门或各职位的分工和任务,人、财、物的流向;还可以了解组织的规模、集中与分散状况及管理的功能与

范围。

44.答案:D

45.答案:B

解析:“条条大路通罗马”是指达成目标有多种途径。面对不同的沟通对象,面对不同的情形,应该采取不同的沟通方式以达到事半功倍的效果。因此,其对应的是“使用恰当的沟通方式”的策略。

46.答案:D

解析:协调的基本要求包括及时协调与连续协调相结合、从根本上解决问题、调动当事人的积极性、公平合理和相互尊重。

47.答案:E

48.答案:C

49.答案:B

50.答案:A

解析:健康教育的研究领域非常广泛,主要分为两大类。按目标人群或场所分为学校健康教育、职业人群健康教育、医院健康教育、社区健康教育。按教育目的或内容分为防治疾病健康教育、营养健康教育、环境保护健康教育、生殖健康教育等。

51.答案:E

52.答案:C

53.答案:D

54.答案:B

55.答案:E

56.答案:D

57.答案:C

解析:紫外线灯照射强度监测应每半年一次。

58.答案:C

解析:可能接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物、污染的器械后应立即洗手。脱去手套后也应及时洗手。在两个患者之间,当手可能传播微生物污染环境时;同一患者,接触身体的不同部位时应洗手。

59.答案:C

60.答案:C

解析:乙型肝炎主要传播途径为血液传播,血液中 HBV 含量很高,共用牙刷和剃刀可使微量污染血液进入人体造成感染。

61.答案:D

62.答案:B

解析:护理仪器设备的维护是针对组织内部具体工作问题,在较小范围内和较短时间内实施的计划,是战术性计划。

63.答案:A

解析:目标管理的基本精神是以自我管理为中心。目标的实施,由目标责任者自我进行,通过自身监督与衡量,不断修正自己的行为,以达到目标的实现。

64.答案:D

解析:沟通障碍中接受者的障碍包括:过度加工,导致信息的模糊或失真;知觉偏差,导致对信息理解的偏差(心理障碍,导致信息的阻隔或中断;思想观念上的差异,导致对信息的误解)。

65.答案:A

解析:有效沟通的策略包括:使用恰当的沟通方式;考虑接受接受者的观点和立场;充分利用反馈机制;以行动强化语言;避免一味说教。

66.答案:C

解析:谈话的技巧包括:做好谈话计划;善于激发下级的谈话愿望;善于启发下属讲真情实话;掌握发问技巧,善于抓住重要问题;善于运用倾听的技巧。

67.答案:A

解析:所谓作业,是指从劳动力、原材料等物质资源到最终产品和服务等转化过程,护理工作中常用的作业控制有:护理技术控制、护理质量控制、医疗护理所用材料及药品购买控制、库存控制等。

68.答案:E

解析:护理管理控制的关键点有:关键制度、高危护士、高危患者、高危设备和药品、高危科室、高危时间和高危环节。

69.答案:D

70.答案:E

71.答案:B

解析:健康促进的领域包括制定促进健康的公共政策、创造支持环境、发展个人技能、加强社区行动和调整卫生服务方向。

72.答案:E

73.答案:D

74.答案:E

75.答案:C

76.答案:A

77.答案:D

78.答案:B

79.答案:B

80.答案:D

81.答案:A

82.答案:A

83.答案:B

解析:当医务人员接触血液、体液、排泄物、分泌物及污染物品时,应戴清洁手套;进行手术等无菌操作,接触患者皮肤黏膜时应戴手套。

84.答案:B

85.答案:D

86.答案:E

87.答案:C

88.答案:B

89.答案:A

90.答案:A

91.答案:D

92.答案:A

93.答案:C

94.答案:E

95.答案:A

96.答案:C

97.答案:B

98.答案:C

99.答案:D

100.答案:E

解析:手术器械包、硬式容器应平放;盆、盘、碗类物品应斜放,包内容器开口朝向一致;玻璃瓶等底部无孔的器皿类物品应倒

立或侧放;纸袋、纸塑包装应侧放;利于蒸汽进入和冷空气排出。

专业知识

1.答案:B

解析:社区中的个体的发展受整个社会文化的影响,所以具有社会化的功能,而不是家庭化。

2.答案:A

解析:表示计数资料的统计描述指标的是率;表示计量资料的统计描述指标的是均数。

3.答案:D

解析:家庭评估的内容包括家庭结构、基本资料、家庭资源以及家庭发展阶段。社会资源不属于家庭评估的范畴。

4.答案:A

解析:初次家庭访视首先要进行家庭成员的个别评估,然后进行家庭健康评估以及制订护理计划,以后访视时给予适当的护理和指导。

5.答案:C

解析:健康教育的目的是改善、维护和促进个体和社会的健康状况。核心是促进人们改变不良的行为和生活方式。

6.答案:D

解析:沟通时要注意技巧,谈话过程注重重复重要的内容,尽量简单明了,尽量用通俗的语言,不使用医学术语。

7.答案:B

8.答案:C

解析:过度娱乐是需要控制的,正常娱乐对身心是有利的。

9.答案:E

解析:COPD 患者的家庭氧疗,低浓度吸氧:氧流量 1~2 L/min;一昼夜不少于 15 小时;夜间不间断;达到使 $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$,

$\text{SaO}_2 > 90\%$;COPD 伴慢性呼衰者提倡长期家庭氧疗。

10.答案:A

解析:产前检查是社区护理的一项重要内容。明确产前检查的是从怀孕开始到怀孕结束。

11.答案:C

解析:疫苗打开后常温下失活的时间是 2 小时。

12.答案:B

解析:出生时需要接种的疫苗有乙肝和卡介苗。

13.答案:A

解析:产后忧郁一般发生在产后 1 天到 6 周内。最常见的为 1~10 天内。

14.答案:A

解析:5 岁以下儿童第一位死因是肺炎,其次是腹泻。

15.答案:D

解析:高血压病是确定的首要脑血管病的危险因素。

16.答案:A

解析:偏瘫患者的被动运动应尽早开始,并适用于偏瘫各个时期运动一般先上肢后下肢,运动量由小到大。

17.答案:C

18.答案:C

19.答案:D

解析:对于老年前列腺增生症,家庭护理注意避免过度劳累;温热水坐浴;不宜久坐;不饮酒,防止便秘;并注意不宜多吃脂肪类食物。

20.答案:D

解析:龋齿发生率在青少年时期的 15~17 岁最高,占 68%左右。

21.答案:C

解析:对社区人群的评估一般包括人口数量和分布,人口年龄、性别、信仰的构成及变动情况以及经济阶层和文化程度和健康水平。但不必要的评估内容是人口相貌的评估。

22.答案:B

解析:急性病的诊治与护理属于医院的范畴。

23.答案:D

解析:健康促进的总体目标是一个宏观的目标,是努力的方向。

24.答案:E

解析:知是知识或信息,信是正确的信念和积极的态度,行是产生健康促进的行为。知识是基础,是行为改变的必要条件。而有了信念才会采取健康的生活方式和行为,达到目的。

25.答案:A

解析:老年人临床合理用药五大原则是指:受益原则;五种药物原则;小剂量原则;暂时停药原则以及择时原则。

26.答案:A

解析:冠心病的发生率一般男性多于女性;多发生于 40 岁以上;脑力劳动者多;欧美国家多;生活富裕的地域多。

27.答案:C

解析:脑血管病的先兆症状包括突然眩晕、突然剧烈头疼、步履蹒跚,走路腿无力、哈欠不断、鼻出血、血压异常等。

28.答案:B

解析:一般一次哺育的时间在 20 分钟之内。

29.答案:B

解析:社区常见的健康促进活动包括社区体育锻炼、AIDS 教育、慢性病的综合防治以及母乳喂养等内容。

30.答案:E

解析:家庭权力结构是反映权力在家庭内部的分布情况,决策时谁的作用最大,谁的作用次之,以及做决定时家庭成员之间的相互作用方式。家庭权力结构主要有传统权威型、工具权威型、感情权威型、分享权威型等集中类型。传统权威型常为男权主义;工具权威型,指经济占主导地位;感情权威型,如“妻管严”;分享权威型,多是协商和民主的方式(如家庭会议)起主要作用。

31.答案:D

32.答案:E

解析:社区卫生服务以解决社区主要卫生问题,促进居民健康水平,集预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的基本卫生服务。

33.答案:D

解析:表示计数资料的统计描述指标的是率;表示计量资料的统计描述指标的是均数。

34.答案:A

解析:动态人口学调查一般包括出生率、死亡率、结婚率以及人口增长率等方面的调查。

35.答案:A

解析:健康的家庭应具备维持和发展家庭成员健康功能的能力和职责。家庭健康护理的主要目的是维持和提高家庭的健康水平及其家庭自我保健功能

36.答案:B

解析:社区健康教育的讲座或演讲时间最好控制在 45 分钟左右由于社区中听讲座的对象大部分是老年人,时间过长老年人很难坚持。过短可能讲座内容不能很好理解和解释,所以在作讲座前做好时间安排和准备。

37.答案:D

解析:行为矫正的方法包括脱敏法、强化法、示范法、替代法和厌恶法。

38. 答案: E

39. 答案: C

解析: 产后白色恶露约持续 3 周干净。

40. 答案: C

解析: 压力性尿失禁是中老年妇女最常见的尿失禁。

41. 答案: B

解析: 2~12 岁儿童身长大概的计算公式是身长 $\text{cm} = \text{年龄} \times 7 + 70 \text{ cm}$ 。

42. 答案: B

解析: 6 个月前婴儿最好母乳喂养, 一般在 4~6 个月添加辅食。

43. 答案: E

解析: 眩晕在清晨起床时发生得最多。

44. 答案: E

解析: 偏瘫患者常见并发症包括压疮、肺炎、尿路感染以及便秘。

45. 答案: E

46. 答案: A

解析: 意外损伤是青少年时期死亡的主要原因。好发于 15~24 岁之间, 且男性远多于女性。

47. 答案: C

解析: 妇女更年期早晚不一, 但大多数人在 45~55 岁。

48. 答案: B

解析: 健康促进的具体目标是具体的、可测量的、可完成的、可信的, 并且有时间限制的。

49. 答案: D

解析: 目前 AIDS 健康教育的内容主要是防止 AIDS 的传播, 以安全性行为教育和禁毒教育为主。

50. 答案: D

解析: 健康促进需要强化的是社区行动。而非政策制定或家庭行动、个人行动以及社会行动。

51. 答案: B

解析: 家庭访视时间一般以不超过 1 小

时为宜。

52. 答案: D

解析: 健康状态 = 环境 + 生物学因素 + 生活方式 + 卫生保健设施获得性。

53. 答案: A

解析: 社区服务重点包括妇女, 但常指生育期和老年妇女。正常青年女性不在其内。

54. 答案: B

55. 答案: E

解析: 家访的优点包括与健康有关的环境因素能被观察和考虑、有利于家庭其他成员的参与、减少住院次数、缩短住院时间, 而且多数人愿意在家接受照顾。

56. 答案: D

解析: “生活方式病”常由不良行为与生活习惯引起。主要是饮食、睡眠、风俗、运动等习惯。

57. 答案: E

解析: 糖尿病患者足部护理要求不能用热水袋热足部, 也不能日光下暴晒。

58. 答案: B

59. 答案: A

60. 答案: B

61. 答案: D

解析: 压力性尿失禁是中老年妇女最常见的尿失禁。原因多为雌激素水平下降。坚持盆底肌训练会有效。

62. 答案: D

63. 答案: E

解析: 社区护理与临床护理的区别点在于其服务性质、服务对象、工作目的、对象的种类等方面都不相同。

64. 答案: A

65. 答案: E

66. 答案: C

解析: 社区护士的角色包括: 护理提供者、咨询者、教育者、协调者、管理者、研究者等多项角色。

67.答案:B

68.答案:C

69.答案:D

70.答案:D

解析:家庭生活周期从夫妻结婚形成开始,经历出生第一个孩子后的扩展期,直到孩子独立成家后的收缩期,再发展到夫妻退休或死亡后的衰弱期。

71.答案:B

72.答案:D

73.答案:A

解析:中年期应付危机的方式很多,但效果不同。认识压力是面对压力的第一步;逃避是无效的;自杀和药物滥用是破坏性的应付方式。

74.答案:A

75.答案:B

76.答案:D

解析:方差分析用于两个以上样本均数之间的比较;卡方检验用于两组或两组以上样本率的比较;t检验用于两个样本均数之间的比较。

77.答案:C

78.答案:B

79.答案:D

80.答案:A

解析:不同类型的家访针对不同的家庭情况。如预防性家访用于妇幼保健与计划免疫;评估性家访用于有危机或病残家庭的评估;连续性家访用于慢性病或康复期的患者及临终患者;急诊性家访用于临时问题或紧急情况家庭。

81.答案:A

82.答案:B

解析:家庭类型有多种。我国最常见的是核心家庭,占67%,指由父母及未婚子女组成的家庭或“丁克”家庭,特点是结构简单、关系较稳定但资源少。另一种类型是主干家庭,即由父母、已婚子女及第三代组成

的家庭。此外,还有由核心家庭及其较近的亲戚,如叔叔、姑姑、姨妈等组成的联合家庭的类型。

83.答案:B

84.答案:A

85.答案:E

解析:脑出血起病急,进展快,诱因明显。首发症状多为头疼、呕吐、意识障碍。突然神志昏迷是脑出血的最主要症状。

86.答案:C

87.答案:B

88.答案:E

89.答案:A

解析:家庭中的沟通方式根据是否有感情分为情感性沟通和机械性沟通;根据是否表达清楚本意分为模糊性沟通和清晰性沟通;根据是否直接表达心里想法分为直接沟通和间接沟通。

90.答案:A

解析:老年期痴呆的主要表现包括近记忆力减退、定向力障碍、思维、判断力障碍、情感障碍、行为失常、记忆力障碍等方面。其中最常见的症状是近记忆力减退。

91.答案:C

92.答案:B

93.答案:E

94.答案:D

95.答案:B

96.答案:A

97.答案:C

98.答案:D

解析:胎盘早剥的隐性剥离可形成胎盘后血肿,其阴道出血量和贫血程度不一致;少量阴道流血,伴轻微下腹痛,宫颈口未开,属于先兆流产表现;妊娠晚期或临产时无痛性反复阴道出血是前置胎盘的典型表现分娩阻滞,剧烈疼痛,宫缩停止,病情恶化,是子宫破裂的征象。

99.答案:D

100.答案:B

解析:健康促进的总体目标是一个宏观的目标,是努力的方向。而具体目标是具体

的、可测量的、可完成的、可信的,并且有时间限制的。

专业实践能力

1.答案:C

2.答案:E

3.答案:C

4.答案:E

5.答案:A

解析:甲型病毒性肝炎的传播途径主要为粪-口传播,还可经间接接触进行传播。

6.答案:C

7.答案:B

8.答案:B

9.答案:C

解析:反常呼吸为呼吸时出现与正常胸壁呼吸运动相反的运动,由多根多处肋骨骨折造成胸壁软化,发生浮动引起。

10.答案:D

11.答案:B

12.答案:E

13.答案:D

14.答案:D

15.答案:B

解析:为提高老年人用药依从性,需要做到以下几个方面:严格给药规程,发药到手,帮助老人服药后方可离开;出院带药时要说明或写明药名、用量、时间;社区护士定期到老人家中清点剩余药数;对于外用药物,要贴红色标签,告知不可口服;此外开展健康教育,并建立合作性护患关系。

16.答案:B

解析:临终患者心理反应及分期目前最为人们所公认的是美籍精神病学家库勒-罗斯博士1996年在《On Death and Dying》一书中提出的临终患者五个心理阶段,即:否认期、愤怒期、协议期、忧郁期和接受期。

17.答案:A

18.答案:C

19.答案:D

解析:偏瘫患者的被动运动应尽早开始,并适用于偏瘫各个时期运动一般先上肢后下肢,运动量由小到大。

20.答案:B

21.答案:B

解析:动态人口学调查一般包括出生率、死亡率、结婚率以及人口增长率等方面的调查。

22.答案:A

23.答案:B

24.答案:C

解析:人工主动免疫是将疫苗或类毒素接种于人体,使机体产生获得性免疫力的一种防治微生物感染的措施,主要用于预防。

25.答案:B

26.答案:E

27.答案:A

28.答案:A

29.答案:C

解析:烧伤休克属于低血容量性休克,主要与体液自血管床的大量外渗有关。

30.答案:C

31.答案:A

解析:有伤口和出血时,在骨折固定之前,应先止血、包扎,若伤员已发生休克,应先进行抗休克处理。

32.答案:E

33.答案:D

34.答案:D

解析:头下垫枕的目的是防止面部淤血

变色。

35.答案:C

36.答案:B

解析:慢性病管理需要团队的合作,团队包括全科医生、社区护士、患者和家属、康复师、心理咨询师、社会工作者以及志愿者等,其中社区护士是团队的核心,起着协调作用。

37.答案:C

38.答案:A

解析:轮椅是伤残使用最广泛的辅助性支具,属于生活自理和防护辅助设备。

39.答案:B

40.答案:B

41.答案:B

解析:初次家庭访视首先要进行家庭成员的个别评估,然后进行家庭健康评估以及制订护理计划,以后访视时给予适当的护理和指导。

42.答案:A

43.答案:E

44.答案:E

45.答案:A

46.答案:B

47.答案:B

48.答案:E

49.答案:D

50.答案:C

解析:早期休克表现为面色苍白,皮肤厥冷,口唇或四肢末梢轻度发绀神志清楚,伴有轻度兴奋,烦躁不安;血压大多正常,个别还可升高,脉快、脉压较小;呼吸深而快;尿量较少;眼底动脉痉挛。患者表现与上述特点相符,属休克早期。

51.答案:D

解析:为使心肺复苏确实有效,必须将患者的头、肩和躯干作为一个整体同步翻转成仰卧位,双臂应置于躯干两侧。若患者在软床上,应在其身下垫硬木板,或视现场情

况在平地进行。

52.答案:A

53.答案:A

54.答案:A

55.答案:D

56.答案:B

57.答案:E

58.答案:D

59.答案:D

60.答案:A

61.答案:B

62.答案:C

解析:一期梅毒的皮肤病变为硬下疳,潜伏期为2~4周。

63.答案:A

解析:梅毒病原治疗首选青霉素、头孢类药物。

64.答案:D

解析:梅毒患者应避免性生活引起的直接和间接接触传播,未治愈前应避免性生活,以免生殖器充血使病情加重、自身扩散和传染给性伴侣。

65.答案:B

66.答案:A

67.答案:B

68.答案:D

69.答案:A

70.答案:A

71.答案:B

72.答案:E

解析:三环类药物是临床上常用的抗抑郁药物,包括丙咪嗪、阿米替林和多塞平等。

73.答案:E

解析:三环类抗抑郁药均有抗胆碱能和心血管系统不良反应,常见的有口干、便秘、视力模糊、排尿困难、直立性低血压以及心动过速和心律改变等。

74.答案:B

75.答案:E

76.答案:C

77.答案:D

78.答案:A

79.答案:D

80.答案:A

81.答案:A

82.答案:E

83.答案:C

84.答案:A

解析:患者表现提示可能发生脊柱骨折,凡疑有脊柱骨折者应使其脊柱保持正常生理曲线,切忌使脊柱做过伸过屈的动作,搬运时应使脊柱在无旋转外力的情况下三人用手同时平抬平放至木板上,人少时可用滚动法。

85.答案:B

解析:怀疑脊髓损伤的患者在运送途中须应用硬板床,保持头略低位,防止过伸过屈位

86.答案:B

解析:ROM 为 range of motion,即关节活动范围,是脊髓损伤患者康复护理中的重要环节,包括肌力训练、某些特定关节的 ROM 训练和手功能训练等。

87.答案:E

88.答案:D

89.答案:C

解析:根据我国《传染病防治法》,传染病分为甲、乙、丙三类。甲类(强制管理传染病)包括鼠疫、霍乱。乙类(严格管理传染病)包括病毒性肝炎、细菌性和阿米巴性菌痢、伤寒和副伤寒、艾滋病、淋病、梅毒、脊髓灰质炎、麻疹、百日咳、白喉、流行性脑脊髓膜炎、猩红热、流行性出血热、狂犬病、钩端螺旋体病、布鲁菌病、炭疽、流行性和地方性斑疹伤寒、流行性乙型脑炎、黑热病、疟疾、登革热、肺结核、新生儿破伤风。丙类(监测

管理传染病)包括血吸虫病、丝虫病、包虫病、麻风病、流行性感、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎,除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

90.答案:A

91.答案:B

解析:浅Ⅱ度烧伤损伤表皮全层并波及真皮乳头层,有大小不等的薄壁水疱,水疱破溃后有渗液,基底红润,压之褪色,疼痛剧烈且痛觉敏感。

92.答案:C

解析:深Ⅱ度烧伤伤及真皮深层,可见小水疱,表皮松动,下有少量积液,若除去坏死表皮,可见基底微湿,苍白或红白相间,有粟粒状红点,数日后可见网状小血管血栓,局部温度较低,感觉迟钝,质韧。

93.答案:D

解析:Ⅲ度烧伤损伤皮肤全层,附件全部受累,甚至深达皮下、筋膜、肌肉骨骼和内脏等。局部苍白,棕褐或焦黑色,干燥、收缩甚至炭化。皮肤感觉丧失,触之坚硬似皮革,拔毛不痛。

94.答案:D

95.答案:A

96.答案:C

97.答案:B

98.答案:A

99.答案:D

100.答案:C

解析:传染病的社区管理重点是预防,应贯彻三级预防的原则。一级预防是通过健康促进、健康教育、免疫接种等手段降低传染病的发病率。二级预防要做到早发现、早诊断、早报告、早治疗、早隔离。三级预防是对传染病患者积极治疗并开展康复治疗护理,减少并发症和功能障碍的发生。

模拟试卷(二)

基础知识

1.答案:B

2.答案:C

3.答案:A

解析:肛裂常发生在肛管后正中部位,当病人处于膝胸位,肛裂部位在正上方。

4.答案:C

解析:痰细胞检查简单易行。

5.答案:E

解析:病因目前尚不十分清楚,可能与以下因素有关:血管病变、妊娠高血压综合征、慢性高血压和肾炎病人常并发胎盘早剥;机械性因素如腹部受撞击、挤压、摔伤或行外倒转术纠正胎位;子宫静脉压突然升高。

6.答案:A

7.答案:B

解析:股骨下1/3和胫骨上1/3骨折易引起腘动脉损伤。

8.答案:D

解析:滴虫适宜生长的温度为25~40℃,pH 5.2~6.6的潮湿环境最适宜其生长繁殖。

9.答案:E

解析:子宫缩乏力是产后出血的最主要原因,占产后出血总数的70%~80%。

10.答案:E

11.答案:B

12.答案:D

解析:中心静脉压反映心脏前负荷,而肺动脉楔压反映后负荷。

13.答案:C

解析:肺气肿的病理改变按累及肺小叶的部位分为三种类型:小叶中央型、全小叶

型和混合型。

14.答案:A

解析:病毒性脑炎的80%属肠道病毒感染。

15.答案:A

解析:窒息、产伤是新生儿颅内出血的最主要病因,输注高渗液体、脑血管先天畸形亦是原因之一。

16.答案:B

解析:前囟早闭或过小均属病理情况,如小头畸形。

17.答案:D

18.答案:E

19.答案:D

20.答案:B

21.答案:D

22.答案:E

解析:凡血培养阳性的全身感染称为菌血症。

23.答案:D

24.答案:B

25.答案:A

26.答案:B

解析:小儿出生平均体重为3kg,前6个月生长最快,故3~5个月时是出生体重2倍,即6kg;1岁时约3倍;2岁时约4倍。

27.答案:C

解析:禁忌证包括生殖器官急性炎症、慢性盆腔炎急性或亚急性发作者;月经期或有不规则阴道出血者;有严重的心、肺疾病者。

28.答案:E

解析:脑膜炎双球菌是暴发性脑膜炎的致病菌。

29.答案:A

30.答案:D

解析:目前认为慢性胃炎约90%由幽门螺杆菌感染所引起。

31.答案:A

32.答案:A

33.答案:E

34.答案:B

35.答案:B

解析:前列腺增生的原因不清,目前主要认为与体内雌激素和雄激素水平失调有关。

36.答案:B

37.答案:C

解析:循环血容量于妊娠6周起开始增加,至妊娠32~34周达高峰,约增加35%,平均约增加1500 mL,维持此水平直至分娩。

38.答案:D

解析:习惯性流产指自然流产连续发生3次或3次以上者。

39.答案:E

解析:CO中毒时,脑、心对缺氧最敏感,常最先受损。

40.答案:A

解析:病毒性心肌炎是由嗜心肌性病毒感染引起的。

41.答案:E

42.答案:B

解析:肝硬化腹水一般为漏出液,并发自发性细菌性腹膜炎、结核性腹膜炎或癌变。

43.答案:B

44.答案:A

解析:胆道系统是细菌最主要的入侵途径和最常见的病因。胆道结石等原因并发急性化脓性胆管炎累及胆总管时,因胆囊管和肝总管汇合成胆总管,因此细菌沿胆管上行,可进入肝脏,感染肝形成肝脓肿。

45.答案:C

46.答案:C

47.答案:B

48.答案:A

49.答案:C

50.答案:B

解析:凡是早产胎儿或新生儿血氧浓度降低的任何因素都可引起新生儿窒息。包括孕母因素,如母亲患糖尿病、心肾等全身性疾病,妊高征等产科疾病,孕母吸毒、吸烟等,母亲年龄>35岁或<16岁,多胎妊娠等;分娩因素如脐带绕颈、受压、打结,手术产,产程中使用麻醉、催产药物不当;胎儿因素如早产儿、小于胎龄儿、巨大儿等,呼吸道、心脏等先天畸形,羊水或胎粪吸入导致的呼吸道阻塞,宫内感染导致的神经系统受损等。

51.答案:A

52.答案:A

53.答案:D

解析:产妇于分娩后2~3周血容量恢复至未孕状态,产褥早期血液仍处于高凝状态,红细胞、白细胞、血小板数量明显增加。

54.答案:E

55.答案:E

56.答案:B

57.答案:A

58.答案:D

59.答案:A

解析:闭合性单处肋骨骨折的治疗原则是止痛、固定胸廓和防止并发症。

60.答案:E

61.答案:A

解析:流行病学研究表明,我国属幽门螺杆菌高感染率国家。幽门螺杆菌感染无例外地引起胃黏膜炎症,感染后机体难以清除而变成慢性感染。此菌是慢性浅表性胃炎的最主要病因。

62.答案:C

63.答案:B

64.答案:B

65.答案:C

66.答案:C

解析:虫药的主要毒性是抑制胆碱酯酶,一般胆碱酯酶活性降至正常人的 70% 以下。

67.答案:B

解析:微生物失衡是指在外在环境影响下,正常微生物之间及正常微生物与宿主之间平衡状态改变,由生理型组合转变成病理组合的状态。微生物失衡会引起菌群失调和移位。

68.答案:D

解析:内脏性疼痛的特点是:①痛觉迟钝,刺、割、灼等刺激不敏感,但对较强的张力(如牵拉、膨胀、痉挛)及缺血、炎症等刺激较敏感;②痛感弥散,定位不准确;③疼痛过程缓慢、持续,常伴有焦虑、不安、恐怖等情绪反应。

69.答案:C

70.答案:B

解析:前列腺大致可分为外周区、移行区、中央区和纤维区四个部分,前列腺癌好发于外周区,而良性前列腺增生好发于移行区。

71.答案:D

解析:畸形愈合属于骨折晚期并发症。

72.答案:C

73.答案:E

74.答案:B

75.答案:A

76.答案:C

77.答案:C

78.答案:C

79.答案:A

80.答案:D

解析:青春期少女功血多属无排卵性功血,因其下丘脑-垂体-卵巢轴间的调节功能尚未成熟,垂体分泌的 FSH 相对不足,无正

常月经周期中 LH 的高峰,因此卵巢中的卵泡不能发育成熟而排卵。

81.答案:D

82.答案:B

83.答案:A

84.答案:C

85.答案:C

86.答案:E

87.答案:D

88.答案:A

解析:特发性血小板减少性紫癜实验室检查,血象:血小板 $<100 \times 10^9/L$,有贫血,白细胞正常;骨髓象:巨核细胞数正常或增多,以小型巨核细胞为主。

89.答案:C

90.答案:E

91.答案:E

92.答案:C

93.答案:B

94.答案:A

解析:军团菌肺炎 X 线显示肺炎早期为斑片状浸润阴影,继而肺实变,下叶较多见,单侧或双侧。严重者可伴有空洞、胸腔积液或肺脓肿。肺炎支原体肺炎 X 线呈多种形态的浸润影,呈节段性分布,以肺下野多见,有的从门附近向外伸展。肺炎克雷伯杆菌肺炎 X 线表现为两肺多发的、小叶斑片状病灶,可融合呈大片状阴影,病变区可见小脓肿或空洞。肺炎链球菌肺炎 X 线可见肺病变部呈大片均匀、致密阴影,局限于一叶或一肺段。双肺弥漫性结节性浸润见于病毒性肺炎 X 线片。

95.答案:D

96.答案:C

97.答案:B

98.答案:E

99.答案:A

100.答案:C

相关专业知识

1.答案:D

2.答案:B

解析:崇拜、羡慕的行为,如演员的举止等;通过强迫模仿获得规定行为,如队列训练等。

3.答案:D

4.答案:A

5.答案:A

6.答案:D

解析:授权步骤的内容:确定什么工作需要授权;选择授权对象、明确授权内容、为被授权者排除工作障碍、形成沟通渠道、评价授权效果。

7.答案:E

8.答案:C

解析:职能型组织结构又称多线型组织结构。其特点是:①管理工作分工较细;②由于吸收专家参与管理,可减轻上层管理者的负担;③多头领导,不利于组织的集中领导和统一指挥;④各职能机构往往不能很好配合;⑤过分强调专业化。

9.答案:B

10.答案:E

解析:空气消毒采用的方法中应除外过氧化氢喷雾消毒。过氧化氢属高效消毒剂,具有广谱、高效、速效、无毒,对金属及纺织物有腐蚀性,受有机物影响很大,纯品稳定性好,稀释液不稳定等特点,常用消毒方法有浸泡、擦拭等。

11.答案:E

12.答案:D

解析:健康教育与健康促进的核心是促使人们建立健康的行为和生活方式,制定一系列使行为和生活方式向有益于健康方向发展的策略,从而降低危险因素,预防各种因不良行为或生活方式所导致的健康问题或疾病。

13.答案:E

14.答案:B

解析:三度失调:原正常菌群大部被抑制,只有少数菌种占决定性优势。发生三度失调的原因常为广谱抗菌药物的大量应用使大部分正常菌群消失,而代之以过路菌或外袭菌,并大量繁殖而成为该部位的优势菌。

15.答案:E

16.答案:C

解析:过程评价起始于健康教育计划实施开始之时,贯穿于计划执行的全过程。

17.答案:C

18.答案:E

解析:洗手指征:①接触病人前后,特别是在接触有破损的皮肤、黏膜和侵入性操作前后;②进行无菌技术操作前后,进入和离开隔离病房、ICU、母婴室、新生儿病房、烧伤病房、感染性疾病病房等重点部门时,戴口罩和穿脱隔离衣前后;③接触血液、体液和被污染的物品后。

19.答案:D

20.答案:A

解析:消化道隔离用于防止经粪-口传播的感染。用于伤寒、甲型肝炎、脊髓灰质炎、感染性腹泻、细菌性痢疾等。

21.答案:A

22.答案:E

解析:开放型肺结核的病原菌是结核杆菌,属于抗酸杆菌,应采取抗酸杆菌隔离。

23.答案:C

24.答案:C

解析:临床上抗感染药物主要对病原微生物具有较高的“选择性毒性作用”,对病人不造成危害。其作用机制主要包括:干扰细菌细胞壁合成;损伤细胞膜;影响细菌蛋白质的合成;抑制细菌核酸的合成。

25.答案:E

26.答案:E

解析:术前应用抗生素方法:①有明确指征;②在术前 0.5~1 小时通过静脉给予一次足量抗生素,总的预防用药时间一般不超过 24 小时;③择期的结、直肠手术前,还需通过导泻或灌肠剂进行肠道准备;④高危剖宫产术,应在脐带钳夹后立即预防性应用;⑤万古霉素不作为常规药物。

27.答案:C

28.答案:C

解析:炭疽的传染源是病畜(羊、牛、马、骡、猪等)和病人。人与带有炭疽杆菌的物品接触后,通过皮肤上的破损处或伤口感染可以形成皮肤炭疽;通过消化道感染可以形成肠炭疽;通过呼吸道感染可以形成肺炭疽。对炭疽病人用过的治疗废弃物和有机垃圾应全部焚烧。

29.答案:A

30.答案:E

31.答案:C

32.答案:E

解析:为完成战略决策所规定的目标而制定的组织在未来一段较短的时间内的具体的行动方案为战术决策。

33.答案:A

34.答案:E

解析:组织图也称组织树,指用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能。组织图一般描述下列几种组织结构及管理关系方面的信息:权力结构、沟通关系、管理范围及分工情况、角色结构和组织资源流向等。

35.答案:A

36.答案:D

解析:有效训导的方法:①以平等、客观、严肃的态度面对下属;②具体指明问题所在;③批评对事不对人,不要损害下属的尊严和人格;④允许下属表达自己对问题的看法和理解;⑤控制讨论;⑥对今后如何防

范错误提出建议,达成共识;⑦对于反复发生的错误,逐步加重处罚。

37.答案:B

38.答案:C

解析:环节质量评价常用的评价指标:①护理技术操作合格率;②基础护理合格率;③特护、一级护理合格率;④各种护理表格书写合格率;⑤一人一针一管执行率;⑥常规器械消毒灭菌合格率。

39.答案:C

40.答案:E

41.答案:C

42.答案:A

43.答案:A

44.答案:B

45.答案:A

46.答案:E

47.答案:D

48.答案:D

解析:科室轮转是院内培训方法。

49.答案:E

解析:沟通的过程包括以下 5 个步骤:信息源、编码、传递信息、解码和反馈。信息源是指发出信息的人;编码是发送者将这些信息译成接受者能够理解的一系列符号;传递信息是通过某种通道将信息传递给接受者;解码是接受者将通道中加载的信息翻译成他能够理解的形式,解码的过程包括:接收、译码和理解三个环节;反馈是接受者将其理解的信息再返回发送者,反馈过程是信息沟通的逆过程,包括了信息沟通过程的几个环节。

50.答案:E

51.答案:D

52.答案:E

53.答案:C

54.答案:D

55.答案:C

56.答案:B

57.答案:D

- 58. 答案: E
- 59. 答案: E
- 60. 答案: D
- 61. 答案: B
- 62. 答案: B
- 63. 答案: D
- 64. 答案: A
- 65. 答案: E
- 66. 答案: A
- 67. 答案: A
- 68. 答案: E
- 69. 答案: D
- 70. 答案: C
- 71. 答案: C
- 72. 答案: E
- 73. 答案: E
- 74. 答案: D
- 75. 答案: E
- 76. 答案: C
- 77. 答案: A
- 78. 答案: C
- 79. 答案: D

- 80. 答案: B
- 81. 答案: D
- 82. 答案: B
- 83. 答案: C
- 84. 答案: A
- 85. 答案: C
- 86. 答案: D
- 87. 答案: E
- 88. 答案: B
- 89. 答案: A
- 90. 答案: C
- 91. 答案: A
- 92. 答案: A
- 93. 答案: E
- 94. 答案: A
- 95. 答案: B
- 96. 答案: D
- 97. 答案: D
- 98. 答案: B
- 99. 答案: B
- 100. 答案: C

专业知识

1. 答案: D

解析: 疾病谱的改变是使社区卫生服务成为必要的重要原因之一。心血管疾病以及恶性肿瘤等慢性病取代了传染性疾病的疾病谱的改变, 使社区卫生服务越来越被需要和成为必要。

2. 答案: E

解析: 社区护理计划中应注意的问题是形成书面计划, 选择最佳护理干预措施并确定优先顺序, 制定护理宏观目标与具体目标。

3. 答案: E

解析: 家庭访视的次数不是固定不变的, 而是根据需要访视家庭的具体情况来决定的。

4. 答案: A

5. 答案: C

解析: 关于冠心病康复分期, I 期: AMI 住院期的康复, 一般 3~7 天, 休息为主; II 期: 出院至病情稳定性完全建立一般需要 5~6 周, 需要适当体力活动、循序渐进、禁忌过分用力; III 期: 病情长时间稳定状态, 2~3 个月, 避免竞技性运动, 只在感觉良好时运动, 且训练必须持之以恒。

6. 答案: C

解析: 糖尿病患者运动时随身携带糖果, 但只在感觉有低血糖时才立即进食。

7. 答案: D

解析: 社区护士在健康普查中的作用主要包括: 推动全民健康普查、发放分析调查

问卷以及个人和集体的健康指导、健康教育。

8.答案:C

解析:居家护理的主要对象是指老年人。

9.答案:B

解析:提倡文明、健康、科学的生活方式是健康教育的主要任务

10.答案:A

解析:心绞痛发作时,立即就地休息,舌下含服硝酸甘油,若不缓解,隔3~5分钟再含一片。

11.答案:D

解析:脑血栓多在安静、睡眠、血压下降和血流变慢的情况下发病。发病缓慢,发病时意识清楚。

12.答案:D

解析:社区流行病学研究方法主要有两种,即观察研究和实验研究。观察研究包括描述性研究和分析性研究。描述性研究包括现状调查和筛检;分析性研究包括回顾性研究和队列研究。

13.答案:C

解析:题干中音乐疗法为护理干预措施,减轻癌症患者疼痛为干预效果。通过对照研究其因果关系是否成立,是一种实验研究方法。实验研究主要用于验证药物治疗效果、干预措施、疾病预防中的效果以及危险因素等的研究。

14.答案:B

解析:急性病的诊治与护理属于医院救治的范畴。

15.答案:B

解析:家庭功能包括:情感、社会化、生育、经济及健康照顾功能。

16.答案:E

解析:家庭生活周期可分为新婚期、生产期、学龄前期、学龄期、青少年期、年轻人期、中年期、老年期。生产期的主要任务是适应父母角色,应对养育子女的压力。学龄

期的主要任务是教育子女。青少年期的主要任务是针对青少年的特点,增加沟通,加强性教育老年期的主要任务是适应和应对退休、疾病、丧偶、死亡等多种变化。

17.答案:D

解析:家庭包含几种社会关系,如血缘、亲缘、伙伴、感情、经济、人口生产关系以及社会化关系。

18.答案:D

解析:健康促进需要强化的社区行动。而非政策行动或者是家庭行动、个人行为以及社会行动。

19.答案:C

解析:健康教育的基本原则包括因材施教、寓教于乐、循序渐进、启发诱导、社区参与、程序性原则。

20.答案:A

解析:孕妇的性生指导是一项重要内容,社区护士须给予正确指导。孕妇在怀孕3个月内和妊娠32周后需要也避免性生活,以免发生流产或早产。

21.答案:C

解析:妇女更年期早晚不一,但大多数人是在45~55岁。

22.答案:B

解析:老年人药效学特点包括:老年人对药物敏感性增强,作用增强;不良反应增加;依从性较差;对多种药物耐受性较差;对肝脏有损害的药物耐受性减弱。

23.答案:A

解析:加强老年人药疗方面的指导与教育,包括在药袋上用醒目颜色标明注意事项及药物名称和用法;老年人常发生失眠、便秘、疼痛,鼓励首选非药物性措施;指导老人不可以随意购买及服药;同时进行家属的安全用药知识教育;当老人用药出现不良反应时及时停药,防止用药不当的意外发生。

24.答案:B

解析:青春期心理发育过程中的特点是:对性发育的困惑;独立意向发展很快;伙

伴关系密切;自我意识迅速发展及人生理想的形成;认识社会的能力不够强。

25.答案:E

解析:慢性病的危险因素有多项,其中行为因素包括吸烟、饮酒、不合理膳食、缺乏体力活动,此外,还有环境因素和不可改变因素,如年龄、性别以及遗传等。

26.答案:D

解析:乙肝是通过血液传播的,可以是性传播,母婴垂直传播。

27.答案:E

解析:传染病的二级预防要做到“五早”,即早发现、早诊断、早报告、早治疗、早隔离。

28.答案:B

29.答案:D

解析:社区是以地域为基础的实体,由正式的、非正式的组织、机构和群体等社区系统组成,行使社区功能,是彼此依赖、生活上相互关联的大集体。WHO 指出的社区表针对全球范围内,有些国家人群居住分散,所以一个社区的范围较广,应为 5 000 ~ 50 000 平方公里。

30.答案:A

解析:社区卫生服务的概念明确指出:社区在政府领导下,社区参与、上级卫生机构指导,以基层卫生机构为主体,根据社区存在的主要健康问题,合理使用资源和技术,主动为社区居民提供基本的卫生服务。

31.答案:E

解析:社区保健系统是社区社会系统中最重要的内容。包括保健机构的种类、数量、利用率、人力资源、经费来源等。

32.答案:D

解析:目前国际上常用的社区护理方法有家庭访视、健康指导、健康普查、健康教育和社区组织活动等。一般不采用流行病学调查。

33.答案:A

解析:家庭权力结构是反映权力在家庭

内部的分布情况,决策时谁的作用最大,谁的作用次之,包括权力来源、权力结果和决策过程。权力来源须视其成员的个性、角色、能力、家人认同而定。权力结果指的是最后做主的人。决策过程是家庭产生共识而采取的行动方式。

34.答案:B

解析:家庭资源充足,可通过调试,应对家庭压力事件,恢复正常功能。家庭危机包括由意外事件引发的危机、家庭发展所伴随的危机、与照顾者有关的危机和家庭结构本身造成的危机。由意外事件引发的危机有灾害、意外事故。丧偶、离婚属于家庭发展所伴随的危机。家庭某一成员长期患病需要照顾属于与照顾者有关的危机。

35.答案:A

解析:居室空气消毒可以采用,通风、食醋熏蒸、过氧乙酸喷雾的方法。患者用过的床垫、被褥、枕头、衣物可采用日光暴晒的方法。患者用过的餐具可采用煮沸消毒的方法。传染患者的分泌物、排泄物、呕吐物均应消毒处理后再倒掉。患者用过的脸盆、便盆、痰杯等可用 1% ~ 0.5% 过氧乙酸浸泡消毒 2 小时后洗净待用。

36.答案:D

解析:生物遗传、环境、社会政治、经济等因素都是影响健康的因素。但从健康教育角度看,对人群健康起主要影响作用的是环境和生活方式。

37.答案:B

解析:青春期需要促进健康心理的成熟,而不必要过早地开展生殖健康教育。生殖健康教育属于生育期的保健内容。

38.答案:C

解析:母乳喂养对新生儿发育很重要,至少坚持到 4 ~ 6 个月,然后指导合理添加辅食。

39.答案:A

解析:家庭健康理的目的是维持和提高家庭的健康水平及其家庭自我保健功能。

一般来说,家庭护理的目的非调节家庭矛盾、缓和夫妻关系、提供经济支持或提供教育支持。

40.答案:A

解析:家访的艺术包括:在合适的时间、之前有周密的计划、谈话时开门见山,并控制家访时间,急性病为先,慢性病为后等。

41.答案:D

解析:产前检查是社区护理的一项重要内容。产前检查的范围是从怀孕开始到怀孕结束。第一次产前检查是怀孕后的 12 周之前。

42.答案:C

解析:中国城市妇女前五位死因包括心脏病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病以及损伤、中毒等外部疾病。

43.答案:D

解析:社区妇女保健是以预防为主;以保健为中心;以维护妇女身心健康为目标;以群体为对象的。

44.答案:B

解析:慢性病管理需要团队的合作,团队包括全科医生、社区护士、患者和家属、康复师、心理咨询师、社会工作者以及志愿者等,其中社区护士是团队的核心,起着协调作用。

45.答案:D

解析:慢性病是长期的、不可逆的、不可自然消退的患病过程,造成人体多种功能障碍或者残疾等,需要长期的照顾。

46.答案:A

解析:老年人临床合理用药五大原则是指:受益原则;五种药物原则;小剂量原则;暂时停药原则以及择时原则。

47.答案:C

解析:开启后的疫苗或菌苗,有效时间为室温 2 小时,冷藏 24 小时。

48.答案:A

解析:问卷调查最好是正式的随机抽样方法,使结果更具代表性。

49.答案:C

解析:社区卫生服务的主要内容包括预防、医疗、计划生育以及健康教育等。而各种保健仪器的试用属于商家在各小区的行为,不属于社区卫生服务内容。

50.答案:A

解析:由于该家庭父亲是权威,家庭权力中心在于父亲。家庭权力中心决定了家庭事务的解决主要依靠中心人物。

51.答案:C

解析:问卷调查需要注意:一个问题只涉及一件事情;避免诱导的方式;慎重处理敏感与隐私问题;合理安排顺序;最好随机抽样。

52.答案:B

解析:核心家庭是由父母及未婚子女或收养子女两代组成的家庭,核心家庭的特点是结构简单、关系较稳定、资源较少。随着现代社会的发展,主干家庭有不断减少的趋势。

53.答案:B

解析:居家照顾团队由各专业人员协同完成。团队成员包括护理人员、医师、康复师、营养师、药剂师、社工人员等。分工不同,但都是以服务对象为中心。护士的作用是为居家患者提供直接性的护理照顾和健康教育指导护士的作用还包括协助其他专业人员对患者进行康复锻炼和日常生活活动能力的训练。

54.答案:E

解析:语言性健康教育包括:交谈、咨询、讨论、讲座等。

55.答案:C

解析:产前检查的频率根据孕龄大小。怀孕 28 周内,每 4 周检查一次;怀孕 29~36 周,每 2 周检查一次;怀孕 36 周后每周检查一次。

56.答案:B

解析:产后至少 3 次,第 1 次在出院后 3 天;第 2 次在 14 天;第 3 次在 28 天。

57. 答案:C

解析:老年期妇女生理上的突出表现是绝经

58. 答案:A

59. 答案:E

60. 答案:C

61. 答案:C

62. 答案:A

解析:该患者未能坚持按医嘱服药,导致血糖控制不良,所以目前最主要的是药物依从性差。

63. 答案:D

解析:该患者由于药物依从性差以及饮食控制不良,故此,最主要的护理目标是长期严格按医嘱服用降糖药和进行饮食控制。只有这样才能很好的控制血糖。

64. 答案:B

解析:为达到长期严格按医嘱服用降糖药和进行饮食控制的护理目标,目前必需的护理措施是加强药物方面的护理,比如指导用药,督促用药,定期检查等方法。

65. 答案:B

66. 答案:B

67. 答案:A

解析:关于糖尿病的一级预防指的是纠正可控制的危险因素,如把肥胖、缺乏体力活动、不合理膳食以及不健康的生活方式。二级预防指的是预防糖尿病并发症,包括为患者制订饮食计划,运动计划,血糖监测计划等。三级预防是减少致残率和死亡率。此外,对于糖尿病足的护理指导,主要包括每天坚持小腿和足部运动30~60分钟;伤口不可用2%碘酊消毒处理;伤口处不可涂甲紫消毒;鞋袜大小合适,不要太紧。

68. 答案:E

69. 答案:B

70. 答案:A

解析:评价筛检试验真实性的最鉴本指标是灵敏度和特异度。灵敏度是指在有病者中试验结果为阳性的百分比;特异度是

指在无病者中,筛查试验结果为阴性的百分比。

71. 答案:A

72. 答案:C

解析:家庭类型有多种。我国最常见的是核心家庭,占67%,指由父母及未婚子女组成的家庭或“丁克”家庭,特点是结构简单、关系较稳定但资源少。另一种类型是主干家庭,即由父母、已婚子女及第三代组成的家庭。此外,还有由核心家庭及其较近的亲戚组成,如叔叔、姑姑、姨妈等组成的联合家庭的类型。

73. 答案:A

74. 答案:E

75. 答案:E

76. 答案:B

解析:救护中分别用不同颜色表示伤员的病情轻重,红色标志着一小时内需要接受治疗护理的伤员;黄色标志着4~6小时内需要接受治疗护理的伤员;黑色是损伤严重、生存希望渺茫的标志或为遇难伤员所用的标志。

77. 答案:B

78. 答案:C

79. 答案:C

80. 答案:D

81. 答案:B

解析:青春期各年龄段有成长、认识、情绪等变化。12~14岁是快速生长,其速度达最高峰的年龄,常常情绪变化大;15~17岁是第二性征的发育明显的年龄,表现为常常自我为中心,自我陶醉;17~20岁时感情较专注,能忍耐。

82. 答案:D

83. 答案:B

84. 答案:E

解析:健康促进除计划的具体目标外,还有教育的具体目标和行为的具体目标。教育的具体目标包括知识、信念、态度;行为的具体目标指执行计划一段时间后,行为转

变的情况。

85.答案:A

86.答案:B

87.答案:B

88.答案:C

89.答案:D

解析:对于新发现的甲类传染病,城市报告时间为 2 小时,农村报告时间为 6 小时;对于新发现的乙类传染病,城市报告时间为 6 小时,农村报告时间为 12 小时;对于新发现的丙类传染病,城市报告时间为 24 小时之内。

90.答案:D

91.答案:A

92.答案:C

93.答案:B

解析:各社区已经开展了各种各样的健康促进活动,但目前为止比较普及的有以下几项:社区体育锻炼、学校卫生和烟草预防、

艾滋病教育、慢性病的综合防治以及母乳管养等。

94.答案:B

95.答案:A

96.答案:E

97.答案:C

解析:传染病的传播方式多种,不同疾病主要的传播方式有所不同,应采取不同方式分别注意预防。

98.答案:A

99.答案:D

100.答案:E

解析:根据 2005 年美国心脏协会的最新 CPR 技术,每次确定呼吸或循环有无的评估过程要求限制在 10 秒内;每 2 分钟或 5 个回合的 CPR 后,救护人员的轮换过程要求限制在 5 秒内;每次人工呼吸的时间为 1 分钟;在进行 CPR 时,减少打断时间,限制在 10 秒内。

专业实践能力

1.答案:C

2.答案:A

3.答案:C

解析:属于计划免疫的疫苗包括:卡介苗、脊髓灰质炎糖丸、百白破三联混合制剂、麻疹疫苗和乙肝疫苗。

4.答案:A

5.答案:A

6.答案:D

解析:有机磷农药中毒患者烟碱样症状表现为胸部压迫感,全身紧束感,肌纤维颤动,面部、胸部常见,渐发展为全身抽搐,最后因呼吸肌麻痹而死亡。

7.答案:A

8.答案:A

解析:近视眼的预防护理要点:一般连续看书 1 h 以上需要休息。

9.答案:E

10.答案:A

11.答案:A

12.答案:B

解析:急性 HIV 感染,又称窗口期,患者在感染后 12 周内,也可长达 6 个月,有感冒症状、发热、关节及全身痛、淋巴结肿大,血清抗体可呈阴性,但 HIV 数量极高,传染性极强。无症状 HIV 感染阶段个体无特殊不适,CR 细胞数量进行性减少。

13.答案:C

解析:约束带的使用方法要正确,要有衬垫,约束在功能位置,打结不宜过紧过松,以能伸进一指为宜,约束时间不宜过长,一般 30 分钟至 1 小时为宜,若需长时间约束,应 1~2 小时松解一次,进行局部按摩,协助大小便。

14. 答案: B

解析: 社区护士怀疑患者有自杀观念时, 应与患者说理, 指出自杀是不对的, 帮助患者认识自杀是病态表现, 同时要了解使患者产生自杀企图的压力来源, 指导他们如何减轻焦虑、气愤和悲观情绪的方法。

15. 答案: E

解析: 麻疹、水痘、风疹、结核病经空气传播需采取空气隔离, 金黄色葡萄球菌主要是接触传播。

16. 答案: C

解析: 病原携带状态按携带病原体持续时间是否在 3 个月以下分为急性携带者和慢性携带者。

17. 答案: B

解析: 抗-HBs 为机体针对 HBsAg 产生的中和抗体, 一般于 HBsAg 转阴后出现, 可持续多年, 其滴度与保护作用相平行。阳性见于既往曾感染 HBV, 现已有一定的免疫力。接种乙肝疫苗后, 一般只出现抗-HBs 单项阳性。

18. 答案: E

解析: 结核菌素试验为用 1:2000 的 OT 稀释液 0.1 mL (5 IU), 在左前臂屈侧作皮内注射, 经 48~72 小时对测量皮肤硬结直径, 如小于 5 mm 为阴性, 5~9 mm 为弱阳性 (提示结核菌或结核分枝杆菌感染), 10~19 mm 为阳性反应, 20 mm 以上或局部出现水疱与坏死者为强阳性反应。

19. 答案: B

20. 答案: B

解析: 食物中毒的突出特点包括潜伏期较短、季节性明显、人与人之间不传染、临床症状相似及有食用相同食物史。

21. 答案: D

解析: 膀胱功能训练的间歇导尿法应严格掌握间歇时间; 每 4~6 小时导尿 1 次, 每日导尿不宜超过 6 次, 在每次导尿前配合各种辅助方法进行膀胱训练。

22. 答案: C

解析: 全髋关节置换术后应保持患肢的功能位, 即可固定关节, 又能减轻切口张力, 减轻疼痛。患肢应置于髋关节外展 10°~20°, 屈曲 10°~15° 中立位。

23. 答案: C

解析: 关于药物镇痛世界卫生组织建议实施“三阶梯镇痛治疗方案”, 属于第一阶梯止痛药物的是非麻醉性镇痛剂, 如阿司匹林、安痛定 (阿尼利定)、布洛芬等, 适用于轻度疼痛。

24. 答案: D

解析: 临终关怀的基本原则之一是适度治疗的原则。临终患者的基本需求为保存生命、解除痛苦和无痛苦死亡。临终关怀以支持患者、控制症状、解除痛苦的姑息治疗和实施全面护理为主, 不赞成无原则的延长生命。

25. 答案: B

解析: 脊髓损伤患者应尽早用倾斜床进行站立训练, 早期用倾斜床站立的优点之一是调节血管紧张性, 预防直立性低血压。

26. 答案: E

解析: 正确的包扎方向一般由左向右, 从远心端向近心端, 以利于静脉血液的回流。切忌在口、骨隆突处或易于受压的部位打结。

27. 答案: D

解析: 食人性中毒, 一般服毒物后 6 小时内洗胃最有效。

28. 答案: A

解析: 细菌性痢疾的潜伏期为 1~2 日。

29. 答案: B

解析: 乙型病毒性肝炎的传播途径主要为血液、体液传播, 还可经母婴垂直传播。

30. 答案: C

31. 答案: A

解析: 去机构化管理是西方发达国家近数十年来大力提倡和推广的精神病治疗和管理体系。所谓“去机构化”是指逐步关闭大规模的封闭管理式的精神病医院, 将患者

接回家,在家人与社区设施的照顾下于正常的环境中疗养,帮助他们回归家庭和社区。

32.答案:B

解析:妄想是患者在意识清楚下出现的病理性歪曲信念,是病态推理和判断。

33.答案:B

解析:开放性气胸现场急救应立即封闭伤口使开放性气胸变为闭合性气胸。

34.答案:B

解析:急性坏死型胰腺炎是急性胰腺炎的一种类型,由急性水肿型胰腺炎病变继续发展所致。胰腺腺泡、脂肪、血管大片坏死,胰腺组织水肿,体积增大,广泛性出血坏死。腹膜后间隙大量血性渗出液。出现休克的主要原因为有效血容量不足,属于低血容量休克。

35.答案:B

解析:睡眠障碍的表现主要是入睡困难、难以熟睡,易醒(而非易惊醒)醒后不易再睡,有时早醒。

36.答案:D

解析:属于计划免疫的疫苗包括:卡介苗、脊髓灰质炎糖丸、百白破三联混合制剂、麻疹疫苗和乙肝疫苗。

37.答案:E

解析:根据我国《传染病防治法》,传染病分为甲、乙、丙三类。丙类(监测管理传染病)包括血吸虫病、丝虫病、棘球蚴病、麻风病、流行性感、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎,除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

38.答案:A

解析:濒死期是死亡过程的开始阶段,脑干以上神经中枢功能抑制或丧失,脑干以下功能尚存,表现为意识模糊或丧失,呼吸、循环衰竭,代谢紊乱,机体各系统和功能严重障碍。濒死又称临终。

39.答案:C

解析:急性巴比妥类药物中毒,轻度表现为患者出现嗜睡,推动可叫醒、反应迟缺、

言语不清、有判断及定向力障碍,该患者表现与上述特点相符。A、B、E均可于家中环境或患者呼出口气中闻及气味,故不正确。D食物中毒一般以胃肠道表现为主,与该患者表现不符。

40.答案:E

解析:患者青年女性,有性接触史,发热、咳嗽、喘憋3个月余,经多种抗生素治疗无效,全身状况日渐衰竭,全身淋巴结肿大符合艾滋病临床表现特点,应考虑行HIV抗体检测。

41.答案:E

解析:HIV的传播途径有:性接触传播、血液和血制品传播、母婴传播及被污染的针头刺伤或破损皮肤受污染、器官移植等,蚊虫叮咬、打喷嚏、咳嗽、与HIV感染者拥抱、与HIV感染者共同进餐不会传播HIV。

42.答案:A

解析:化学疗法现代结核病最主要的治疗方法。其原则为:早期、联合、适量、规律和全程用药。

43.答案:A

解析:精神疾病恢复期患者的服药护理,重点在于不断加强患者对坚持服药重要性的认识,坚持服药治疗的目的在于治疗疾病,预防和减少疾病的复发。

44.答案:C

45.答案:D

46.答案:B

47.答案:C

48.答案:A

49.答案:B

解析:青春期心理发育过程中的特点是,对性发育的困惑独立意向发展很快;伙伴关系密切;自我意识迅速发展及人生理想的形成;认识社会的能力不够强。

50.答案:C

解析:临终关怀的基本原则之一是适度治疗的原则。临终患者的基本需求为保存生命、解除痛苦和无痛苦死亡。临终关怀以

支持患者、控制症状、解除痛苦的姑息治疗和实施全面护理为主,不赞成无原则地延长生命。

51.答案:A

解析:加压包扎止血法是最常用的止血方法,毛细血管出血、静脉出血及前臂和足部动、静脉出血,均可用绷带纱布加压包扎止血,一般20分钟后即可止血。

52.答案:D

53.答案:A

解析:按照国务院及卫生部有关医疗废物处理条例规定必须将用后的利器稳妥地、安全地放在防水、耐刺、有明显标识的利器盒内,装3/4满时,密闭运送至医疗废物集中存放场,并及时运送焚烧处理,以防止对医护人员、运送人员及环境污染和刺伤他人而导致感染性疾病的传播。

54.答案:B

55.答案:D

解析:患者的表现符合抑郁心境表现,此外还出现抑郁发作时的躯体症状;食欲下降、睡眠障碍等。

56.答案:A

解析:患者男性有急性尿道炎表现,有不洁性接触史,致病菌革兰阴性双球菌属奈瑟淋球菌特点,符合淋病表现。

57.答案:D

解析:早期休克表现为面色苍白,皮肤厥冷,口唇或四肢末梢轻度发绀;神志清楚,伴有轻度兴奋,烦躁不安;血压大多正常,个别还可升高,脉快、脉压差较小;呼吸深而快;尿量较少;眼底动脉痉挛。患者表现与上述特点相符,属休克早期。

58.答案:D

解析:手部出血,首选指压止血法,压迫尺、桡动脉。

59.答案:D

解析:脱出的内脏应以无菌敷料或干净容器覆盖再包扎,不应送回腹腔,以防增加感染机会或内脏继续脱出,故A、B不对。对

该患者应首要处理肠脱出,故C不对。E为错误选项,因增加腹壁张力,加重疼痛,不宜选平卧位。

60.答案:A

解析:患者有高血压病史,有“不认识女儿”等近事记忆障碍及“急躁、易激动”等情绪不稳人格保持相对完整,符合血管性痴呆的表现。

61.答案:A

解析:抑郁症表现为抑郁心境,其主要特点是情绪低沉、苦恼忧伤、兴趣索然。

62.答案:D

解析:抑郁情绪的典型变化特点是晨重夜轻。

63.答案:A

64.答案:B

65.答案:B

66.答案:A

67.答案:B

解析:根据题干所给信息,该患者有最可能的诊断是再生障碍性贫血。主要依据有:①外周血象:全血细胞减少;②骨髓象骨髓有核细胞增生低下,粒系、红系低下,巨核细胞缺如。

68.答案:D

解析:再生障碍性贫血的主要危险因素有氯霉素、X射线接触、病毒感染、遗传因素,因此,选项A、B、C、E是正确的。再生障碍性贫血与饮食无关。

69.答案:C

70.答案:A

解析:氯氮平抗胆碱能不良反应较多,常见有头晕、无力、嗜睡、多汗、流涎、恶心、呕吐、口干、便秘、体位性低血压、心动过速。

71.答案:D

解析:氯氮平可引起白细胞减少,不宜作为首选药物。

72.答案:B

解析:氯氮平可引起白细胞减少,在治疗开始的前3个月内,应每1~2周查白细

胞,一旦出现粒细胞下降应立即停药,积极处理。

73.答案:C

74.答案:D

75.答案:D

76.答案:A

解析:该患儿表现符合中毒型急性菌痢的临床表现,中毒型以儿童多见,起病急骤,病势凶险,高热体温可达 40℃ 以上,伴余身毒血症状,以严重毒血症,休克和中毒性脑病为主要表现,而肠道症状轻,但发病后 24 小时内可出现腹泻及痢疾样大便。

77.答案:B

解析:该疾病致病微生物为痢疾杆菌,属肠杆菌科志贺菌属,为 G-杆菌,主要流行菌群为 B 群,可产生内毒素,该菌在外界环境中生存能力较强。

78.答案:C

解析:预防该病的综合措施中最重要的是加强社区卫生监督管理,包括健康教育、社区卫生管理、检查和治疗带菌者、做好疫情报告和疫源地处理等。

79.答案:A

解析:该患者“不能正确回答自己亲人的名字与年龄、外出找不到家门”的记忆障碍与“饮食不知饥饱,举止幼稚,不知羞耻等”人格改变符合阿尔茨海默病的表现,CT 检查可排除脑血管病变导致的痴呆。

80.答案:D

解析:记忆障碍常为本病的首发症状,如经常失落物品,遗忘已许诺的事情,言语啰唆、重复等。

81.答案:A

解析:该病病释举科性发展,最导发展至严重的痴呆,丧失生活能力需人照顾。

82.答案:D

解析:患者意识丧失,对呼唤声无反应,瞳孔对光反射存在,属昏迷状态。

83.答案:A

解析:昏迷患者一般应去枕平卧,将头

偏向一侧,以防舌后坠及误吸。

84.答案:C

解析:通过观察尿量可评价血管活性药物的应用是否有效。

85.答案:B

解析:对昏迷患者防止肌肉萎缩的有效护理措施为肢体被动锻炼,肌肉按摩。

86.答案:E

解析:双大腿烧伤面积为 21%,双足烧伤面积为 7%,共计 28%。

87.答案:E

解析:总面积在 51% 以上或Ⅲ度烧伤面积在 21% 以上为特重度烧伤,该患者符合特重度烧伤。

88.答案:C

解析:其治疗最为重要的是检查是否有火焰造成的吸入性损伤,保持呼吸道通畅。

89.答案:E

90.答案:A

91.答案:D

92.答案:B

解析:对甲类传染病、SARS 和乙类传染病中艾滋病、肺炭疽、脊髓灰质炎的患者、病原携带者或疑似患者,城镇应于 2 小时内,农村应于 6 小时内通过传染病疫情监测信息系统进行报告。

93.答案:C

解析:对乙类传染病中除艾滋病、肺炭疽、脊髓灰质炎的患者、病原携带者或疑似患者和伤寒、副伤寒、痢疾、梅毒、淋病、乙型肝炎、白喉、痢疾的病原携带者,城镇应于 6 小时内、农村应于 12 小时内通过传染病疫情监测信息系统进行报告。

94.答案:E

解析:流行性腮腺炎属丙类传染病,对丙类传染病和其他传染病,应当在 24 小时内通过传染病疫情监测信息系统进行报告。

95.答案:A

解析:脊髓损伤抢救期之后就应该尽早开始康复介入,包括预防压疮、肢体置功能

位及被动关节运动,呼吸训练及排痰训练和防止泌尿系感染等措施。

96.答案:B

解析:脊髓损伤患者一旦生命体征稳定、骨折部位稳定、神经损害或压迫症状稳定、呼吸平稳后,即可进入恢复期治疗,主要以运动功能康复为主。

97.答案:B

解析:罪恶妄想表现为患者毫无根据地坚信自己犯了严重错误或不可宽恕的罪行,应受严厉的惩罚,要求劳动改造或以请罪等手段赎罪。

98.答案:E

解析:思维被洞悉妄想表现为患者认为

其内心所想的事未经言语文字表达而被周围人所洞悉。

99.答案:E

解析:当临终患者心理反应处于接受期时,其突出表现是:情绪显得平和、镇定,已看不出恐惧、焦虑和悲哀,精神和肉体均极度疲劳、衰弱,常处于嗜睡状态,情感减退,对外界反应淡漠。

100.答案:A

解析:当临终患者心理反应处于否认期时,其突出表现是:对即将到来的死亡常常会感到震惊和否认,怀侥幸心理四处求医,希望是误诊,听不进对病情的任何说明与解释。这个阶段为期短暂,可能持续数小时或几天。

